

برنام آنکه جان را فکرت آمودت

پنجشنبه
۹۶/۳/۴

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
معاونت آموزشی

دیرخانه شورای آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی
مرکز سنجش آموزش پزشکی

سوالات آزمون ورودی دکتری تخصصی (Ph.D)

سال تحصیلی ۹۶-۹۷

رشته: ایمنی‌شناسی پزشکی

تعداد سوالات: ۱۵۰

زمان پاسخگویی: ۱۵۰ دقیقه

تعداد صفحات: ۱۹

مشخصات داوطلب:

نام:

نام خانوادگی:

آزمون ورودی
دانشگاه
پزشکی

داوطلب عزیز

لطفا قبل از شروع پاسخگویی،

دفترچه سوالات را از نظر تعداد صفحات به دقت مورد بررسی قرار داده و در صورت وجود
هرگونه اشکال به مسئولین جلسه اطلاع دهید.

توجه: استفاده از ماشین حساب مجاز نمی‌باشد.

مشاوره و پشتیبانی

جزوه



تقویت رزومه

نمره زبان MSRT / MHLE



کلاس (گروهی و خصوصی)

آزمون آزمایشی




ایمنی شناسی

۱ - اگر در آزمایش رایت لوله‌ای یک نوزاد (زیر سه ماه) تیتر آزمایش رایت و ME-2 با هم برابر و به اندازه ۱/۸۰ باشد
تفسیر شما در مورد نوزاد چه خواهد بود؟

- الف) دچار بروسلوز حاد است
- ب) دچار بروسلوز تحت حاد است
- ج) دچار بروسلوز مزمن است
- د) بیمار نیست

۲ - در آزمایش ELISA مرحله بلوکه کردن (Blocking) به چه منظور انجام می‌شود؟

- 
- الف) چسباندن آنتی‌ژن به کف چاهک
 - ب) افزایش ویژگی پاسخ
 - ج) پایان دادن به واکنش آنتی‌ژن و آنتی‌بادی
 - د) افزایش حساسیت

۳ - آنتی‌بادی علیه کدام مولکول می‌تواند از مهاجرت لنفوسیت‌های T بکر به گره‌های لنفاوی جلوگیری نماید؟

- الف) Glycam - 1
- ب) Selectin - E
- ج) ICAM - 1
- د) VLA - 4

۴ - به منظور فعال نمودن و تکثیر سلول‌های NK در *In vitro* جهت استفاده از آنها در سرطان‌ها از همه سایتوکاین‌های زیر استفاده می‌گردد، بجز:

- الف) IL-2
- ب) IL-12
- ج) IL-15
- د) IFN-γ

۵ - در مقایسه سلول‌های DC با ماکروفازها همه گزینه‌های زیر صحیح است، بجز:

- الف) مقدار فاگوزوم و لیزوژوم کمتری دارند.
- ب) اسید فسفاتاز و کاتاپسین زیادی دارند.
- ج) میزان اسیدیتۀ لیزوژوم کمتری دارند.
- د) با سرعت کمتر از ماکروفازها آنتی‌ژن را هضم و عرضه می‌کنند.

۶ - در مورد تکنیک فلوسیتومتری همه گزینه‌های زیر صحیح است، بجز:

- الف) این روش در شناسایی پروتئین‌های داخل سیتوپلاسمی استفاده می‌شود.
- ب) مراحل چرخه سلولی با استفاده از این تکنیک قابل بررسی است.
- ج) اندازه سلول‌ها و گرانولیتی آن‌ها قابل شناسایی است.
- د) در مورد سلول‌های خون محیطی انحراف نور به سمت جلو در لنفوسیت‌ها بیشتر از نوتروفیل‌ها است.

۷ - مهم‌ترین کاربرد روش Surface Plasmon resonance در ایمونولوژی کدام است؟

- الف) برای تشخیص میل پیوندی آنتی‌بادی به آنتی‌ژن کاربرد دارد
- ب) نوعی از روش ایمونو‌هیستوشیمی است که براساس بیوسنسورها طراحی شده است
- ج) برای جدا کردن سلول‌ها بر اساس آنتی‌بادی متصل شده به سطح سلول کاربرد دارد
- د) در ارزیابی پاسخ سلول T کاربرد دارد





۸ - کدام یک از کموکاین‌های زیر باعث مهاجرت و استقرار ائوژینوفیل‌ها در بافت‌های محیطی و مهاجرت آن‌ها از مغز استخوان می‌شود؟

د) CXCL28

ج) CXCL25

ب) CCL12

الف) CCL11

۹ - در مورد گیرنده‌های شبه Toll (TLR) تمامی گزینه‌های زیر صحیح است، بجز:

الف) تمامی انواع این گیرنده‌ها از طریق MyD88 انتقال پیام را به انجام می‌رسانند.

ب) دارای ساختار مشابه ناحیه داخل سیتوپلاسمی با اینترلوکین نوع یک می‌باشند.

ج) نواحی خارج سلولی این گیرنده‌ها دارای واحدهای تکراری حاوی لوسین و آسپاراژین می‌باشد.

د) این گیرنده‌ها موجب فعال شدن فاکتورهای نسخه‌برداری NFKB، AP-1، IRF3 و IRF7 می‌شوند.

۱۰ - در مورد سلول‌های لنفوئیدی ذاتی (Innate Lymphoid Cells) تمامی گزینه‌های زیر صحیح است، بجز:

الف) پیش‌ساز این سلول‌ها، فاکتور نسخه‌برداری Id2 را بیان می‌کند

ب) زیرگروهی از این سلول‌ها دارای مارکر CD16 و CD56 می‌باشند

ج) تحت تأثیر IL-7، IL-1 و IL-23، این سلول‌ها اینترفرون گاما ترشح می‌نمایند

د) این سلول‌ها از مغز استخوان منشاء یافته و دارای عملکرد اجرایی مشابه سلول‌های T می‌باشند

۱۱ - کدام یک از پدیده‌های زیر زودتر از سایرین در تکامل سلول‌های B رخ می‌دهد؟

د) حذف آللی

ج) بازآرایی V به DJ

ب) بروز CD10

۱۲ - کدام یک از خصوصیات زیر در سلول‌های B خارج فولیکولی و مراکز زایگر مشترک است؟

الف) نیاز به سیگنال CD40 برای فعال شدن

ب) میزان میل ترکیبی آنتی‌بادی

ج) میزان هیپرموتاسیون های سوماتیک

د) فاکتورهای نسخه‌برداری

۱۳ - در ایزووتایپ سوئیچینگ کدام نقش بر عهده activation induced deaminase می‌باشد؟

الف) ایجاد جایگاه‌های فاقد باز

ب) تشکیل R-Loop

ج) برش جایگاه‌های فاقد باز

د) تبدیل سیتوزین به اوراسیل

۱۴ - ساز و کار تغییرات آنتی‌زنیک (Antigenic Variation) توسط تمام باکتری‌های زیر برای فرار از سیستم ایمنی استفاده می‌شود، بجز:

د) نایسروا گونورآ

ج) اشرشیاکلی

ب) پنوموکوکوس

۱۵ - اصلی‌ترین دلیل وقوع chronic mucocutaneous candidiasis (CMC) در مبتلایان به این عفونت منتشر چه می‌باشد؟

الف) نقص در تولید پپتیدهای آنتی میکروبیال (AMP)

ب) نارسایی تولید IgA

ج) عدم کفایت پاسخ Th17

د) عدم کفایت پاسخ Th1



۱۶ - سلول‌های دندان‌پستانکی پلاسموسیتوئیدی، همه حالت‌زیر را در عفونت‌های ویروسی بر عهده می‌گیرند، بجز:

- الف) تولید انترفرون تیپ I
- ب) انتقال آنتی‌زن ویروسی به سایر سلول‌های DC
- ج) عرضه آنتی‌زن ویروسی به T سل بکر (naïve Tcell)
- د) تولید اینترلوکین ۱۲ و ۱۸

۱۷ - تولید لنفوتوکسین بتا (LT β) در روده توسط کدامیک از سلول‌های زیر صورت می‌پذیرد؟

(الف) سلول‌های لنفوئیدی ذاتی (ILC₃)

(ب) سلول‌های میکروفولد (M cells)

(ج) DC های آستر مخاطی (لامیناپروپریا)

(د) DC های برداشت کننده آنتی‌زن (پلاک پی بر)

۱۸ - در مورد اثر هوک در آزمایش الیزا همه موارد زیر صحیح است، بجز:

(الف) در غلظت بالای آنالیت بروز می‌کند

(ب) در غلظت بالای آنتی‌بادی شناساگر (detector) بروز می‌کند

(ج) اضافه کردن همزمان آنالیت و آنتی‌بادی شناساگر در الیزای ساندویچی بروز آن را افزایش می‌دهد

(د) با رقیق کردن سرم می‌توان اثر هوک را از بین برد

۱۹ - کدام زوج سیتوکاین‌های زیر به صورت اتوکراین در تمایز سلول‌های Th₁₇ و Th₁ نقش دارند؟

IFN-γ, IL-21 IFN-γ, IL-23 IL-4, IFN-γ TGF-β, IFN-γ (الف)

۲۰ - کدامیک از سلول‌های زیر نقش اساسی در مقابله با عفونت لیستریامنوسیتوژنز بر عهده دارد؟

Th₂ Th₁₇ NK Th₁ (الف)

۲۱ - ویرایش ایمونولوژیک تومور (Tumor immunoediting) با کدامیک از تعاریف زیر سازگارتر است؟

(الف) رشد سلول‌های توموری در موش سالم و انتقال آن به یک موش سالم از همان نوع و پیشرفت تومور

(ب) رشد سلول‌های توموری در موش با نقص ایمنی و انتقال تومور به یک موش سالم و پیشرفت تومور

(ج) رشد سلول‌های توموری در موش با نقص سیستم ایمنی و انتقال آن به موش دارای نقص ایمنی و پسرفت تومور

(د) رشد سلول‌های توموری در موش سالم و انتقال آن به یک موش دارای نقص ایمنی و پسرفت تومور

۲۲ - هترودادیمر CD94/NKG2A جزء کدام نوع از گیرندهای سلول‌های NK می‌باشد و به کدام مولکول وصل می‌شود؟

HLA-E, HLA-G HLA-E, HLA-G HLA-E (الف)

۲۳ - تمامی عوامل نسخه برداری زیر در تکامل سلول‌های B نقش دارند، بجز:

Pax5 E2A EBF Notch 1 (الف)

۲۴ - در خصوص لنفوسيت‌های ILC (innate lymphoid cells) کدام جمله درست است؟

(الف) عملکرد آن‌ها شبیه سلول‌های NK می‌باشد

(ب) در خون بیشتر از بافت‌ها وجود دارند

(ج) در تیموس بهمراه سلول‌های Th تکامل پیدا می‌کنند

(د) سایتوکاین‌های شبیه به زیر گروه‌های T کمکی تولید می‌کنند

۲۵ - ویروس Epstein Barr از مسیر پیام رسانی کدام مولکول Cells جهت تکثیر در سلول و ایجاد لمفوم استفاده می‌کند؟

CD40

CD22

CD20

CD21

۲۶ - در تحمل ایمنی مادر به جنین، همه موارد زیر می‌توانند نقش مهمی در بقای حاملگی داشته باشد، بجز:

(الف) بیان Fas-L توسط سلول‌های تروفوبلاست جنین

(ب) عملکرد سلول‌های T تنظیمی

(ج) کاهش غلظت آمینو اسید تریپتوفان در دسیدوا

(د) تولید فاکتورهای ایمونوسوپرسور توسط بلاستوسیت در مرحله لانه گزینی

۲۷ - کدام ایزوفورم از HLA-G به ملکول بتا دو میکروگلوبولین متصل است؟

HLA-G2

HLA-G6

HLA-G3

HLA-G1

۲۸ - مهم‌ترین محصول نهایی در فرآیند تشکیل انفلاماژوم، کدامیک از موارد زیر می‌باشد؟

(الف) مهار فعالیت کاسپازیک (ب) فعال سازی نوتروفیل‌ها (ج) تولید اینترلوکین یک بتا (د) وقوع التهاب مزمن

۲۹ - همه گزینه‌های زیر در مورد CAR-T cell (chimeric antigen receptor) صحیح است، بجز:

(الف) هدف گیری CD19 با این سلول در درمان بدخیمی‌های لنفوسيت B مؤثر می‌باشد

(ب) از روش‌های موفق در درمان برخی بدخیمی‌های هماتولوژیک می‌باشد

(ج) از محدودیت‌های مهم این روش استفاده از آنتیژن‌های اختصاصی تومور می‌باشد

(د) دومین انتقال پیام CAR شامل موتیف CD28 و IL-2 می‌باشد

۳۰ - کدام سندروم تظاهری از نقص ایمنی و خود ایمنی است که عمدتاً پوست و دستگاه گوارش را مبتلا می‌سازد و در اثر جهش در ژن RAG، ارتمیس یا IL-7 RA در تکامل لنفوسيت‌ها بوجود می‌آید.

(الف) سندروم اومن (Ommen)

(ب) سندروم ول فرام (Wolfram)

(ج) IPEX

(د) APS-1

۳۱ - در لوسمی میلتوئیدی استفاده از آنتی بادی علیه کدامیک از مارکرهای زیر می‌تواند باعث حذف سلول‌های نئوپلاستیک گردد؟

CD33

CD18

CD11C

CD45

۳۲ - در خصوص ترتیب بیان مولکول‌های زیر پس از فعال شدن لمفوسيت‌های T (Naive T) کدام مورد از چهار راست درست است؟

(الف) CD69 → IL-2R α → CD40L → IL-2 → CTLA4

(ب) IL-2 → CD69 → IL-2R α → CD40L → CTLA4

(ج) CD69 → IL-2 → IL-2R α → CD40L → CTLA4

(د) CTLA4 → CD40L → CD69 → IL-2R α → IL-2

۳۳ - کدامیک از زیر گروه‌های جمعیتی T نام برده شده در زیر از فسفوریلاسیون اکسیداتیو جهت تأمین نیازهای انرژی خود استفاده می‌کند؟

- الف) T effector cells (د) T effector memory (ج) T transient memory (ب) T central memory

۳۴ - فراوان ترین جمعیت ماکروفازی در کدام ناحیه از تشکیلات ایمونولوژیک بدن قرار دارد؟
الف) طحال (ب) گردش خون (ج) لامینا پروپریای روده (د) بافت همبند زیر پوست

۳۵ - همه گزینه‌های زیر در مورد سلوهای MDSC (Myeloid-derived suppressor cells) صحیح است، بجز:

- الف) مارکرهای CD11b ، CD33 و CD15 را بیان می‌کنند
ب) از طریق تولید رادیکال‌های آزاد باعث مهار فعالیت سلول‌های T می‌شود
ج) جمعیت هموژنی از پیش سازهای دندریتیکی هستند
د) باعث تمایز سلول‌های T به Th₂ می‌شوند

۳۶ - کدامیک از ملکول‌های زیر بطور مشترک بر سطح سلول‌های CTL و NK بیان می‌شود و موجب افزایش فعالیت کشنده‌گی آن‌ها می‌گردد؟

- الف) NKG2D (ب) FC_γRIIIA (ج) NKG2A (د) NKG2C

۳۷ - کدامیک از ویژگی‌های زیر در هر دو سلول Plasma blast و Plasma cell وجود دارد؟
الف) MHC II بیان

- ب) میزان بالای ترشح آنتی بادی
ج) میزان کم آنتی بادی سطحی
د) تعویض کلاس آنتی بادی

۳۸ - همه گزینه‌های زیر در خصوص لمفوسيت‌های T کمکی فولیکولی (TFH) صحیح است، بجز:

- الف) برهمکنش ضعیف TCR-MHC بر سطح DC باعث القاء BCL6 و شروع تمایز آنان می‌شود
ب) سلول‌های Bcell فعال نقش اصلی در تمایز آنان دارد
ج) بیان SAP برای تمایز آنان ضروری است
د) IL-21 ، IL-4 ، IFN-γ توسط آنان تولید می‌شود

۳۹ - در مورد تغییرات سیستم ایمنی در دوران پیری کدام گزینه صحیح است؟

- الف) پاسخ سلول‌های B و تولید آنتی بادی ضعیف است ولی تولید سلول‌های B خاطره‌ای نرمال است
ب) تولید IL-7 توسط سلول‌های استروممال مغز استخوان نرمال است
ج) پاسخ پیش سازهای B-Cell در پیری ضعیف است
د) تولید سلول‌های لنفوئیدی و میلتوئیدی به نفع تولید سلول‌های لنفوئید تغییر می‌کند

۴۰ - برای جدا نمودن لنفوسيت B اختصاصی یک آنتی ژن کدام روش صحیح است؟

- الف) روش Panning با استفاده از anti-Ig
ب) روش Panning با استفاده از anti-CD19
ج) نشاندار نمودن آنتی ژن با FITC و استفاده از FACS
د) تحریک با آنتی ژن اختصاصی و انجام Limiting dilution

۴۱ - برای تشخیصی واسکولیت از کدام آزمایش استفاده می شود؟

- Anti- ds DNA (د) ANA (ج) P-ANCA (ب) C-ANCA (الف)

۴۲ - همه موارد زیر در مبتلایان به **X-linked SCID** دیده می شود، بجز:

- الف) بی پاسخی سلول های سیستم ایمنی به IL-15 و IL-7
ب) نقص در تکامل سلول های NK
ج) کاهش فراوانی لنفوسیت های B در اعضاء لنفاوی
د) عدم سنتز زنجیره گامای گیرنده IL-2

۴۳ - کدام گزینه در ارتباط **Polyarteritis nodosa** ناشی از بیماری هپاتیت B صحیح می باشد؟

- 
- الف) واسکولیت حاصل از رسواب کمپلکس های ایمنی در پاسخ به HBsAg می باشد
ب) نفریت و التهاب مفاصل از رسواب کمپلکس های ایمنی در پاسخ به HBsAg می باشد
ج) واسکولیت حاصل از رسواب کمپلکس های ایمنی در پاسخ به HBCAg می باشد
د) نفریت و التهاب مفاصل حاصل از رسواب کمپلکس های ایمنی در پاسخ به HBeAg می باشد

۴۴ - مهمترین آنتی ژنی که باعث می شود آزمایش **C-ANCA** مثبت شود کدام مورد است؟

- الف) پروتئیناز ۳ (د) کاتاپسین G (ج) الاستاز (ب) پیلوپراکسیداز

۴۵ - در تخریب غضروف های مفصلی در بیمار آرتربیت روماتوئید کدامیک از موارد زیر کمتر دخالت دارد؟

- الف) نوتروفیل ها (ب) کندرسیت ها (ج) فاکتور روماتوئید (د) TNF و IL

۴۶ - نقص در تولید کدامیک از مولکول های زیر عفونت های مخاطی را افزایش بیشتری می دهد؟

- د) کمپلمان (ج) IgM (ب) IgA (الف) PIgR

۴۷ - ویژگی درست را در خصوص لوسمی مزمون لمفوسیتی انتخاب کنید؟

- الف) همیشه از منشأ لمفوسیت های B هستند
ب) بیماری سنین کودکی است
ج) آن ها از نوع IgG است
د) معمولاً دارای گیرنده های CD5 می باشند

۴۸ - همه گزینه های زیر در مورد ایمونو پاتوزن ویروس **EBV** در انسان صحیح است، بجز:

- الف) ابتلا به این ویروس می تواند به عفونت منوکلئوز منجر شود
ب) افزایش لنفوسیت های خون محیطی عمدتاً ناشی از تکثیر لنفوسیت های B آلدده به ویروس می باشد
ج) لنفوسیت های B ترانسفورم شده ممکن است باعث ایجاد لنفوم بورکیت شوند
د) فرار لنفوسیت های B بد خیم از سلول های CTL ناشی از کاهش بیان ژن های TAP می باشد

۴۹ - مجموع مارکرهای (C-kit-CD44-CD25+) در کدام مرحله تکوین لنفوسیت های T در تیموس بارز می شود؟

- CD4+ T cell (د) Pre T cell (ج) pro T cell (ب) stem-cell (الف)



۵۰ - در یک بیمار که به گرده علف هرز آبرژی دارد می خواهیم پروتئینی که در سرم بیمار بر علیه آن IgE اختصاصی وجود دارد را شناسایی کنیم کدام یک از روش های زیر کاربرد بیشتری دارد؟

- (الف) ایمونوھیستوژیمی
- (ب) وسترن بلات
- (ج) ایمونوفلورسانس
- (د) فلوساتیومتری

۵۱ - لنفوسيت B در چه مرحله ای از تمایز خود اولین سیگنانل را از طریق ملکول های Igα و Igβ دریافت می کند؟

- (الف) مرحله pro-B
- (ب) مرحله pre-B
- (ج) مرحله Immature B cell
- (د) مرحله Mature B cell

۵۲ - در روش وسترن بلاستینگ آنتی ژن ها با چه روشی از هم جدا می شوند؟

- (الف) با الکتروفورز در ژل پلی آکریل آمید
- (ب) با الکتروفورز روی ورقه نیترو سلولز
- (ج) با روش انتشار در ژل پلی آکرید آمید
- (د) با روش انتظار در ژل آگارز

۵۳ - همه گزینه های زیر در مورد بیماری سندروم افزایش IgM (Hyper IgM syndrom) صحیح است، بجز:

- (الف) نقص در بیان CD40 و CD40L در این بیماران گزارش شده است
- (ب) نقص در بیان AID در این بیماران گزارش شده است
- (ج) تبدیل ایزو تیپ در لنفوسيت B بیماران مشاهده نمی شود
- (د) عفونت با باکتری های داخل سلولی در این بیماران افزایش می یابد

۵۴ - آنتی بادی علیه کدام یک از مارکرهای زیر در درمان بیماری آرتربیت روماتوئید کمک کننده است؟
anti- VEGF anti-CD11α anti- CD52 anti - IL-6R

۵۵ - کدام گزینه بقای سلول های TCD8+ خاطره ای را افزایش می دهد؟
IL-21 IL-23 IL-15 IL-12 IL-12 IL-12

۵۶ - در واکنش های ایمنی در مخاط روده کدامیک از موارد زیر نسبت سلول های Th17 افزایش می دهد؟
IL-1 Trans retinoic acid IL6 TGF-β

۵۷ - تمام سلول های زیر در انتقال آنتی ژن های لومن روده به MALT دخالت دارند، بجز:

- (الف) گابلت سل ها (goblet cell)
- (ب) سلول های دندربیتیک
- (ج) سلول های M (microfold)
- (د) سلول های IEL (Intraepithelial lymphocyte)

۵۸ - مهمترین مارکری که در تشخیص روماتیسم مفصلی بکار می‌رود کدام است؟
الف) Anti-cyclic citrullinated peptide antibody (ACCPA)

- ب) Anti-Keratin Antibody (AKA)
ج) Anti - Perinuclear factor (APF)
د) Anti-Nuclear antibody (ANA)

۵۹ - IL-21 مشخصاً باعث تمایز کدام زیر گروه T می‌شود؟

- د) TH22 ج) TFH ب) TH21 الف) TH17

۶۰ - تیتر بالای کدامیک از اتوآنتی بادی‌های زیر در بیماری‌های سیروز اولیه صفراءوی (PBC) ارزش تشخیصی دارد؟

- الف) آنتی بادی ضد میتوکندری
ب) آنتی LKM-1
ج) آنتی SM
د) آنتی SLA

۶۱ - کدامیک از تست‌های زیر در انتخاب دهنده برای بیماران در لیست انتظار پیوند نقش کلیدی دارد؟

- الف) Donor specific Ab (DSA) قبل از پیوند
ب) Panal Reactive Ab (PRA) قبل از پیوند
ج) HLA - A, B, DR typing قبل از پیوند
د) Historical PRA قبل از پیوند

۶۲ - کودکی ۳ ماهه به بیمارستان ارجاع شده است. در آزمایشات انجام شده کاهش شدید در سطوح ایمونوگلوبولین‌ها و کاهش تعداد لنفوцит‌های B و T مشاهده گردید. کدامیک از نتائچ ژنتیکی زیر می‌تواند عامل زمینه‌ای این بیماری باشد؟

- د) NEMO ج) CD40L ب) BTK الف) ADA

۶۳ - در بیماری X-Linked agammaglobulinemia نقص در کدامیک از مسیرهای زیر می‌باشد؟

- الف) Pre-B cell signaling
ب) Pre-T cell receptor check point signaling
ج) T ccell - dependent B cell activation
د) T cell activation and function

۶۴ - در ایجاد بیماری کولیت آلسراتیو (ulcerative colitis) کدام مورد کمترین دخالت را دارد؟

- د) Th1 ج) ایمنی ذاتی ب) Th17 الف) لنفوцит‌های B

۶۵ - در یک پیوند کلیه فرضی، دهنده عضو دارای گروه خونی AB و گیرنده عضو دارای گروه خونی O می‌باشد، تشابه کامل HLA وجود دارد و فرد گیرنده داروهای ایمونوساپرسیو مناسب دریافت می‌کند. کدام یک از موارد زیر را انتظار دارید؟

- د) رد پیوند مزمن ج) رد پیوند فوق حاد ب) رد پیوند حاد الف) قبول پیوند

۶۶ - آزمایش خون نوزاد ۲ روزه‌ایی، کاهش شدید سلول‌های T، CD4⁺ و CD8⁺ و تعداد کاهش یافته اما در حد طبیعی سلول‌های B را نشان داد. به کدامیک از بیماری‌های نقص ایمنی زیر مشکوک می‌شوید؟

(الف) AIDS

(ب) Digeorge syndrome

(ج) Bare Lymphocyte syndrome

(د) Hyper IgM syndrome

۶۷ - کدام یک از رسپتورهای زیر در خروج لنفوцит‌های T از بافت و غدد لنفاوی نقش اصلی را بعهده دارند؟

CxCR₅

CCR₁₀

CD40L

(الف) S₁PR₁

۶۸ - در زمان شناسایی آنتی ژن توسط cells در سیناپس ایمونولوژیک با APC، کدامیک از مولکول‌های زیر در قسمت distal سیناپس قرار می‌گیرد؟

(الف) LFA-1- ICAM-1

(ب) CD43 - CD45

(ج) CTLA-4 - CD28

(د) TCR - MHC/peptide

۶۹ - سلول‌های دندانیک بالغ کدام نوع از آنتی ژن‌های زیر را با بازده بیشتری عرضه می‌کنند؟

(ب) آنتی ژن‌های پروتئینی

(ج) آنتی ژن‌های ذره‌ای

(د) آنتی ژن‌های سلولی

(الف) پپتیدها

۷۰ - کدامیک از انواع گیرندهای FC γ در روند ضد التهابی IVIG دخالت می‌کند؟

FC γ RII B

FC γ RII C

FC γ RII A

(الف) FC γ R1

۷۱ - کدام گزینه در مورد سلول‌های TH9 درست نمی‌باشد؟

(الف) در بیماری‌های التهابی راه‌های هوایی، آسم و آرژی مژثر هستند

(ب) در حضور TGF. β از سلول‌های TH2 مشتق می‌گردد

(ج) در حضور IL-4 و IL-6 از سلول‌های T بکر (Naïve) تمایز می‌یابند

(د) مشابه سلول‌های TH2 از منابع اصلی تولید IL-9 است

۷۲ - فاکتور نسخه برداری BCL-6 برای تمایز کدامیک از سلول‌های زیر ضروری است؟

Th₂

Th₁₇

T_{FH}

(الف) Th₁

۷۳ - کدامیک از سایتوکاین‌های زیر در شرایط التهابی باعث افزایش پاسخ التهابی می‌گردد؟

IL-10

TNF- β

TGF- β

(الف) IL-4

۷۴ - رسوب کمپلکس ایمنی در پاتوژن تمام اختلالات زیر دخیل است، بجز:

د) رد فوق حاد پیوند

(ب) روماتوئید آرتрит

(ج) واکنش آرتوس

(الف) مalaria

۷۵ - چگونه می‌توان ترشح IFN- γ را افزایش داد؟

(الف) القای بیان STAT6

(ب) القای بیان STAT4

(ج) مهار فاکتور رونویسی GATA2

(د) مهار فاکتور رونویسی GATA3

- ۷۶ - از آنتاگونیست‌های زنجیره P40 مربوط به IL-12 و IL-23 در درمان کدام یک از اختلالات زیر استفاده می‌شود
- (الف) رد حاد پیوند
 - (ب) لوپوسی اریتماتوز سیستمیک
 - (ج) نقرس شدید
 - (د) پسوریازیس

۷۷ - در سندروم Bloom کدامیک از نقایص زیر ملاحظه می‌شود؟

- (الف) Defective DNA Helicase
- (ب) موتاسیون SAP
- (ج) موتاسیون CD19
- (د) Defective STAT3

۷۸ - در خصوص پدیده اتوفازی (Autophagy) همه موارد صحیح است، بجز:

- (الف) گرسنگی سلول (Starvation) باعث شروع این پدیده می‌شود
- (ب) باعث عرضه پروتئین‌های خودی با MHC II می‌گردد
- (ج) باعث افزایش پدیده فاگوسیتوز می‌شود
- (د) میکروآتوفازی (microautophagy) همیشه در سلول در حال انجام است

۷۹ - گزینه درست را در خصوص Thoracic Duct انتخاب کنید.

- (الف) خروجی لمفی یک گروه لمفاوی
- (ب) باعث انتقال سلول‌های بنیادی خون‌ساز به تیموس می‌شود
- (ج) مسیر ارتباط سیستم لمفاوی به جریان خون است
- (د) گره‌های لمفاوی مزانتریک را به سطوح مخاطی متصل می‌کند

۸۰ - تراستوزوماب : Trastuzumab

- (الف) یک آنتی بادی کایمیریک ضد EGFR1 است
- (ب) یک آنتی بادی انسانی کامل (Fully humanized) (عليه C-Erb.2) است
- (ج) یک آنتی بادی انسانی شده (Humanized) (عليه EGFR II) است
- (د) یک آنتی بادی مونوکلونال موشی (عليه HER-2) است

۸۱ - در روند تکامل لنفوسيت‌های T کدام کموکاین باعث مهاجرت لنفوسيت‌های T در حال تکامل از کورتکس تیموس به مدولا می‌شود؟

- (د) CXCL12
- (ج) CXCL10
- (ب) CCL21
- (الف) CCL25

۸۲ - AIM2 جزو کدام دسته از پذیرنده‌های شناسایی الگو است؟

- (الف) Toll-like receptors
- (ب) Cytosolic DNA sensor
- (ج) Nod-Like receptors
- (د) RIG-Like receptor



۸۳ - کدامیک از خصوصیات زیر می‌تواند برای سلول‌های NK، NKT و T-cell مشترک باشد؟

- (الف) تولید γIFN
- (ب) شناسایی آنتیژن عرضه شده توسط CD1
- (ج) شناسایی آنتیژن عرضه شده توسط MHC
- (د) بیان TCR

۸۴ - از عوامل مهم تهاجم و عبور باکتری سالمونلا تیفی موریوم، یکی از گزینه‌های زیر است؟

- (الف) گذر از سلول M (میکروفولدسل)

- (ب) برداشت توسط TLR سطوح اپی تلیال

- (ج) اتصال به سلول‌های اپی تلیال

- (د) فرار از آنتی بادی‌های ترشحی

۸۵ - سلول غالب در بیوپسی کبد از مبتلایان به هپاتیت حاد ویروسی کدامیک از گزینه‌های زیر است؟

- (الف) سلول‌های NK

- (ب) سلول‌های T سیتوکوکسیک CD8⁺

- (ج) منوسیت‌های التهابی

- (د) نوتروفیل‌ها

۸۶ - کدامیک از سلول‌های زیر در بازسازی اپی تلیوم و ترمیم زخم نقش دارد؟

(د) TH22

(ج) TH9

(ب) TH1

(الف) TH17

۸۷ - همه جملات زیر در مورد سلول‌های CTL صحیح است، بجز:

- (الف) با بیان Fas سلول هدف را از بین می‌برند

- (ب) با تولید γIFN-β باعث فعال شدن ماکروفاژها می‌شوند

- (ج) به دنبال از بین بردن سلول هدف از آن جدا شده و سلول دیگری را هدف قرار می‌دهند

- (د) با تولید گرانزایم B باعث آپوپتوز سلول هدف می‌شود

۸۸ - ایجاد جهش در ژن IL-7 موسی یا گیرنده آن چه پیامدی دارد؟

- (الف) نقص شدید در سلول T

- (ب) نقص شدید در سلول T و B

- (ج) نقص در سلول‌های T و B و دندربیتیک

- (د) کاهش روند بلوغ در کلیه مراحل تکامل لنفوسيت‌ها

۸۹ - کدامیک از مکانیسم‌های فرار، نقش مهمی را در عفونت پایدار CMV (سایتو مگالوویروس) ایفا می‌نماید:

- (الف) حذف مولکول کلاس I از MHC در رتیکوکولوم اندوبلاسمیک

- (ب) مهار فعالیت پروتئوز مردم

- (ج) وقفه در سنتز MHC

- (د) مقابله با عملکرد مولکول TAP

۹۰ - سلول‌های (Tumor Associated Macrophages) TAM حاصل گسترش کدام رده ماکروفاژی می‌باشد؟

(م) تحت جمعیت a

(ج) تحت جمعیت b

(ب) تحت جمعیت c

(د) جمعیت d



۹۱ - اصلی ترین مکانیسم مقاومت عفونت ناشی از نیسیریا گونوره آ در سطوح مخاطی مربوط به چه فاکتوری می باشد؟

- (الف) شکست مولکول IgA₁
- (ب) شکست مولکول IgA₂
- (ج) مهار مولکول HF
- (د) شکست مولکول HF

۹۲ - بالاترین میزان بیان مارکر ART2 (ADP-Rebosyl transferase-2) مربوط به کدام گروه از سلول های ایمنی می باشد؟

- (الف) Regulatory T cells
- (ب) Auto reactive T cells
- (ج) Cytotoxic T cells
- (د) Helper-Inducer T cells

۹۳ - بیان کدامیک از مارکرهای زیر در سطح بافت توموری نشانگر متاستاز می باشد؟

- (د) CD44
- (ج) CD105
- (ب) CD72
- (الف) CD10

۹۴ - ماندگاری آنتی ژن در کدامیک از موارد زیر بیشتر است؟

- (الف) شکاف MHC
- (ب) در سطح سلول های دندربیتیک فولیکولی
- (ج) در سطح BCR
- (د) در سطح Mast cells

۹۵ - کدامیک از آنتی ژن های توموری اختصاصی در سطح لمفوم B ظاهر می شود؟

- (د) CA-19.3
- (ج) Mesotheline
- (ب) Idiotype
- (الف) CD5

۹۶ - مهمترین کموکاین در فراخوانی نوتروفیل ها به بافت ها کدام یک از موارد زیر می باشد؟

- (د) CX₃CL1
- (ج) MCP-1
- (ب) CCL-2
- (الف) IL-8

۹۷ - همه مواد زیر در کنترل پاسخ های ایمنی ذاتی نقش دارند، بجز:

- (الف) IL-10
- (ب) IL-1 receptor antagonist
- (ج) IL-1 type II receptor
- (د) IL-15

۹۸ - کدام دسته از گیرندهای زیر بیشترین اتصال را به غشاء سلول دارد؟

- (الف) G-protein-coupled receptor
- (ب) Receptor tyrosin kinase
- (ج) Notch receptors
- (د) immune receptor family





- ۹۹ - کدام یک از ملکول‌های زیر در پروسه **Trancytosis** ایمونوگلوبولین‌ها در اپی تلیوم دستگاه گوارش دخالت دارند؟
- (الف) C₃b
(ب) MHC-Class I
(ج) β₂ microglobulin
(د) Complement receptor (CR1)

۱۰۰ - کراتینوسیت‌های پوستی در همه پروسه‌های زیر دخالت دارند، بجز:

(الف) تولید IL-18

(ب) Ag presentation

(ج) تولید IL-10

(د) تولید پپتیدهای ضد میکروبی

بیوشیمی پزشکی

۱۰۱ - در رابطه با آلفا فیتوپروتئین همه موارد صحیح است، بجز:

(الف) از نظر ژنتیکی و ساختاری شبیه آلبومین است.

(ب) شاخصی برای کارسینوم هپاتوسلولار است.

(ج) در دوران بارداری غلظت آن کاهش می‌یابد.

(د) کبد جنین آلفا فیتوپروتئین می‌سازد.

۱۰۲ - همه پروتئین‌های زیر جزو **positive acute phase reactants** هستند، بجز:

(د) هپتогلوبین

(ج) آلبومین

(ب) فیبرینوژن

(الف) سرولوپلاسمین

۱۰۳ - در بیماری کوشینگ کدام حالت در سرم خون صحیح است؟

(الف) افزایش میزان کورتیزول و کاهش میزان ACTH

(ب) کاهش میزان کورتیزول و افزایش میزان ACTH

(ج) افزایش میزان کورتیزول و افزایش میزان ACTH

(د) کاهش میزان کورتیزول و کاهش میزان ACTH

۱۰۴ - مهارکننده اختصاصی سوکسینات دهیدروژناز کدام است؟

(د) سیانات

(ج) سیترات

(ب) مالونات

(الف) آرسنیت

۱۰۵ - اگزالیک اسید در کدامیک از مسیرهای متابولیک زیر سنتز می‌شود؟

(د) پلی‌آل

(ج) قندهای آمینه

(ب) پنتوز فسفات

(الف) اسید اورونیک

۱۰۶ - کدامیک از اسیدهای آمینه زیر در محدوده ۲۵۰ تا ۲۹۰ نانومتر دارای جذب نوری بیشتری است؟

(د) گلیسین

(ج) تریپتوفان

(ب) فنیل آلانین

(الف) تیروزین



۱۰۷ - کدامیک از ترکیبات زیر از فعالیت استئوکلاست ها جلوگیری می کند؟

- الف) ۱ و ۲۵-دیهیدروکسی کوله کلسيفروول
- ب) کلسیتونین
- ج) هورمون پاراتیروئید
- د) آلكالین فسفاتاز

۱۰۸ - کدامیک از غشاهای زیر دارای بیشترین مقدار کلسترول است؟

- د) هسته
- ب) میتوکندری
- ج) گلزی
- الف) پلاسمایی

۱۰۹ - در توالی GATCCT کدامیک از جهش های زیر انتقالی (Transition) می باشد؟

- | | | | |
|-------|---------|---------|--------|
| GTCCT | GTATCCT | GTTCCCT | GGTCCT |
|-------|---------|---------|--------|

۱۱۰ - آنزیمی که واکنش زیر را کاتالیز می کند کدام است؟

- گلسریل‌آلدئید ۳-فسفات + سدوهپتولوز ۷-فسفات → ریبوز ۵-فسفات + گزیلولوز ۵-فسفات
- الف) ترانس‌لوکاز
 - ب) ترانس‌آمیناز
 - ج) ترانس‌ادولاز
 - د) ترانس‌کتوواز

۱۱۱ - در تولید کرآتن، S-آدنوزیل متیونین، متیل خود را به کدام اسید آمینه می دهد؟

- د) لیزین
- ب) آسپاراژین
- ج) گلیسین
- الف) متیونین

۱۱۲ - در نمودار آنزیمی Lineweaver-Burk شبیه نمودار کدام است؟

- | | | | |
|-------------------|------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| K _m /V | V/K _m | K _m /V _{max} | V _{max} /K _m |
|-------------------|------------------|----------------------------------|----------------------------------|

۱۱۳ - روتون (Rotenone) بازدارنده کدامیک از مراحل زنجیره تنفسی است؟

- الف) کمپلکس IV
- ب) سیتوکروم b ← سیتوکروم C₁
- ج) کمپلکس II ← کوآنزیم Q
- د) کمپلکس I ← کوآنزیم Q

۱۱۴ - کدامیک از آنزیم های زیر توسط متوترکسات (MTX) به عنوان یک داروی ضد سرطان مهار می شود؟

- الف) PRPP آمیدوتранسفراز
- ب) زانتین اکسیداز
- ج) دی‌هیدروفولات ردوکتاز
- د) کرباموئیل فسفات سنتتاز

۱۱۵ - در کمپلکس primosome مسئول بازکردن DNA در جلوی چنگال همانندسازی کدام یک از آنزیم های زیر است؟

- | | | | |
|-------|---------|-------|-------|
| Dna B | Primase | Dna D | Dna G |
|-------|---------|-------|-------|

۱۱۶ - در سنتز داکسی‌ریبونوکلئوتید از ریبونوکلئوتید کدام کوآنزیم شرکت می کند؟

- د) NADPH
- ب) بیوتین
- ج) تیوردوکسین
- الف) اسید فولیک

۱۱۷ - تمام ترکیبات زیر از کلسترول مشتق می‌شوند، بجز:

- الف) او-۲۵-دی هیدروکسی کله کلسيفرون
- ب) دی هیدرو تستوسترون
- ج) توروکولیک اسید
- د) بیلی روبین کونژوگه

۱۱۸ - کدامیک از مشتقات منوساکاریدها از اجزای سازنده گلیکوپروتئین‌ها و گلیکوز‌آمینوگلیکان‌ها محسوب می‌شود؟

- د) اسید سیالیک
- ج) فوکوز
- ب) گلوکرآمین
- الف) گلوكورونیک اسید

۱۱۹ - کدام فرایند را مهار می‌کند؟ Tunicamycin

- acylation (د)
- polyadenylation (ج)
- glycosylation (ب)
- translocation (الف)

۱۲۰ - در ارتباط با چاپرون‌ها کدام گزینه صحیح است؟

الف) همگی برای عملکرد خود به ATP احتیاج دارند.

ب) پروتئین دی سولفید ایزومراز نوعی چاپرون است.

ج) چاپرون‌ها در پروکاریوت‌ها، چاپرونین نامیده می‌شوند.

د) HSP70 با اتصال به پروتئین‌هایی که سنتز آن‌ها کامل شده است عمل می‌کند.

زنگنه پزشکی

۱۲۱ - الگوریتم تشخیصی اختلالات تمایز جنسی به ترتیب چگونه است؟

الف) مشاوره، بررسی گنادها، کاریوتایپ، بررسی هورمونی

ب) بررسی گنادها، بررسی هورمونی، مشاوره، کاریوتایپ

ج) بررسی گنادها، بررسی هورمونی، کاریوتایپ، مشاوره

د) مشاوره، کاریوتایپ، بررسی گنادها، بررسی هورمونی

۱۲۲ - الگوی وراثتی Liddle Syndrome و اثر بالینی آن (به ترتیب) کدام گزینه زیر است؟

الف) Mild hypertension , AD

ب) Virilisation , AD

ج) Mild hypertension , AR

د) Severe hypertension , AD

۱۲۳ - نوع جهش Hb Freiburg کدام است؟

- Frameshift (د)
- Point (ج)
- Insertion (ب)
- Deletion (الف)



۱۲۴ - پروتئین‌های بسیاری توسط کلون سازی ژن‌ها در باکتری‌ها و یا سلول‌های یوکاریوت سنتز شده‌اند که دو نمونه‌ی آن‌ها فاکتور رشد فیبروبلاست و فعال کننده پلاسمینوژن بافت هستند. این دو به ترتیب در درمان کدام بیماری‌ها به کار می‌روند؟ (ترتیب از راست به چپ)

- (الف) Ulcers , Cystic fibrosis
- (ب) Heart attack , Ulcers
- (ج) Ulcers , Cancer
- (د) Growth disorders , Heart attack

۱۲۵ - کدام گزینه در مورد نوع splicing mutation در ژن RET و بیماری حاصل از آن صحیح می‌باشد؟

- (الف) Neurofibromatosis , Gain of function
- (ب) Neurofibromatosis , Loss of function
- (ج) Hirschprung disease , Loss of function
- (د) Hirschprung disease , Gain of function

۱۲۶ - بیماری Congenital muscular dystrophy بر اساس کدام الگوی توارثی به ارث می‌رسد؟

- (د) AD
- (ج) AR
- (ب) XLD
- (الف) XR

۱۲۷ - تبادل سلول‌ها از طریق جفت در بین دو قلوهای غیر همسان در رحم منجر به بروز چه پدیده‌ای می‌شود؟

- (الف) Mixoploidy
- (ب) Blood chemiras
- (ج) Dispermic chimeras
- (د) Mosaicism

۱۲۸ - بیوند سلول‌های بنیادی (Stem cells) در رحم تاکنون برای کدامیک از بیماری‌ها موفقیت آمیز بوده است؟

- (الف) Fanconi anemia
- (ب) SCID
- (ج) ADA deficiency
- (د) X-Linked adrenoleuko dystrophy

۱۲۹ - کدامیک از موارد تالاسمی ممکن است با آنمی فقر آهن اشتباه گرفته شود؟

- (الف) Thalassemia Trait
- (ب) Sickle/thal
- (ج) Thalassemia intermedia
- (د) Hereditary persistence of fetal Hb

۱۳۰ - افزایش خطر ابتلا به اوتیسم در کدام گزینه زیر دیده می‌شود؟

- (الف) مادر بالای ۳۵ سال
- (ب) پدر بالای ۴۵ سال
- (ج) در ازدواج خویشاوندی مکرر
- (د) در سالمند مبتلا به آلزایمر

۱۳۱ - کدام اختلال زیر با روش microarray CGH قابل تشخیص است؟

- (الف) Williams syndrome
- (ب) Bloom syndrome
- (ج) Burkitt lymphoma
- (د) Chronic myelogenous leukemia



۱۳۲ - کدام یک از موارد زیر paradoxical توارث وابسته به ایکس محسوب می‌گردد؟

- الف) مذکر همی زیگوت سالم - مؤنث هتروزیگوت سالم
- ب) مذکر همی زیگوت بیمار - مؤنث هتروزیگوت بیمار
- ج) مذکر همی زیگوت سالم - مؤنث هتروزیگوت بیمار
- د) مذکر همی زیگوت بیمار - مؤنث هتروزیگوت سالم

۱۳۳ - کدام گزینه زیر ویژگی sex limited را نشان می‌دهد؟

- الف) Congenital adrenal hyperplasia
- ب) Levi-Weil dyschondrosteosis
- ج) Hemochromatosis
- د) Baldness

۱۳۴ - رخداد کدام بیماری ژنتیکی به دلیل Founder effect در جمعیت یهودیان اشکنازی معمول است؟

- الف) Huntington disease
- ب) Ellis-van Creveld syndrome
- ج) Hermansky-pudlak syndrome
- د) Familial dysautonomia

۱۳۵ - غشاء جنینی (Fetal membrane) در دوقلوهای دی زیگوت چگونه است؟

- الف) monoamniotic - monochorionic
- ب) monoamniotic dichronic
- ج) diamnioic - dischorionic
- د) diamniotic monochorionic

۱۳۶ - کدام یک از بیماری‌های زیر در اثر Trinucleotide repeat expansion در نواحی اینtronی روی می‌دهد؟

- الف) Myotonic dystrophy
- ب) Friedreich ataxia
- ج) Fragile X syndrome
- د) Huntington disease

۱۳۷ - در خصوص مطالعات GWA، کدام گزینه دست است؟

- الف) هزاران بیماری همراه مارکرهای SNP را شناسایی کرده است
- ب) در شناسایی مسیرهای زیست شناختی (Biological pathways) بیماری‌های پیچیده توفیقی نداشته است
- ج) در شناسایی بیماری‌های تک ژنی غالب وابسته به X، نقش اصلی را ایفا کرده است
- د) در شناسایی بیماری‌های هولاندریک بیشترین توفیق را داشته است

۱۳۸ - کدامیک از بیماری‌های ژنتیک زیر در اثر جهش میتوکندریایی در tRNA روی می‌دهد؟

- الف) LHON
- ب) Leigh syndrome
- ج) Kearns-Sayre syndrome
- د) MERRF



۱۳۹ - در خصوص بیماری و آزمایش بیوشیمیابی برای شناسایی ناقلین، کدام گزینه درست است؟

- (الف) Hemophilia و اندازه‌گیری مقدار فاکتور انعقادی
- (ب) Vit D - Resistance Rickets ، سطح فسفات سرم
- (ج) Fabry و اندازه‌گیری سطح آنزیم در خون
- (د) DMD ، بیوپسی عضلانی

۱۴۰ - در خصوص Fetal anomaly screening و هفته‌های بارداری کدام گزینه درست است؟

- (الف) بین 11^{+2} و 13^{+1} هفته بارداری - سونوگرافی NT
- (ب) بین 10^{+2} و 12 هفته بارداری - آمنیوستنتر
- (ج) بین 13^{+1} و 14^{+1} هفته بارداری - کوردوستنتر
- (د) بین 10^{+2} و 14^{+1} هفته بارداری - رادیوگرافی

۱۴۱ - کدام یک از موارد زیر از مشخصات توارث بیماری‌های کمپلکس (complex diseases) می‌باشد؟

- (الف) ژنتیک‌های متفاوت در بستگان یک خانواده بیانگر عدم وجود برازنده‌گی (Lack of fitness) است
- (ب) سازگاری (concordance) بیشتر با بیماری در دو قلوهای دو تخمی در مقایسه با دوقلوهای یک تخمی وجود دارد
- (ج) فنوتیپ‌های مختلف در بستگان یک خانواده بیانگر عدم وجود نفوذ پذیری (Lack of penetrance) است
- (د) دو قلوهای یک تخمی ناسازگار (Discordant) بیانگر عدم وجود برازنده‌گی (Lack of fitness) است

۱۴۲ - کدام یک از دسته ژن‌های زیر در متابولیسم هلیف وسیعی از داروهای نقش دارند؟

- (الف) NAT6 , NAT3 , NAT1
- (ب) CYP2C19 , CYP2C9 , CYP2D6
- (ج) HLA-B*5701 , HLA-B*1502
- (د) TPMT3 , TPMT1

۱۴۳ - در انسان، حداقل چند درصد از جایگاه‌های ژنی پلی مرفیک (چند شکل) هستند؟

- ۳۰ (د) ۱۰ (ج) ۵ (ب) ۱ (الف)

۱۴۴ - کدام گزینه زیر در خصوص Kabuki syndrome درست است؟

- (الف) در بسیاری از بیماران جهش در ژن هیستون متیل ترانسفراز رخ می‌دهد
- (ب) در بسیاری از بیماران جهش در ژن متیل سنتتاژ رخ می‌دهد
- (ج) در عمدۀ بیماران جهش در ژن الکالین فسفاتاز رخ می‌دهد
- (د) تا کنون گزارشی مبنی بر خداد جهش در ژنی که هیستون دمیتلاز را کد می‌کند، انتشار نیافته است

۱۴۵ - در مورد آنتی ژن H-Y ، فاکتور مهار کننده مولرین MIF کدام گزینه درست است؟

- (الف) بیان آن با حضور یا فقدان بافت بیضه ارتباط دارد
- (ب) نقش بسیار زیادی در پیوند اعضای انسان دارد
- (ج) توسط ژن SRY تولید می‌شود
- (د) برای تمایز و عملکرد بیضه اهمیت دارد

۱۴۶ - کدام یک از جایگاه‌های HLA زیر دارای بیشترین آلل می‌باشد؟

- D (د) C (ج) B (ب) A (الف)



۱۴۷ - نقص در CD40 و آنزیم AICDA به ترتیب عامل بروز کدام یک از اشکال بیماری Hyper IgM syndrome می‌باشد؟

- الف) HIGM2 , HIGM1
 ب) HIGM2 , HIGM3
 ج) HIGM3 , HIGM2
 د) HIGM3 , HIGM1

۱۴۸ - در خصوص تکامل لنفوسيت های T، در مرحله‌ای که رده سلولی pre-TCR آن را بيان می‌نماید، مارکر سلولی لنفوسيت‌ها چگونه است؟

- الف) CD4⁺, CD8⁺ ب) CD4⁺, CD8⁻ ج) CD4⁻, CD8⁺ د) CD4⁻, CD8⁻

۱۴۹- کدام روش زیر بدون پیش فرض در خصوص نوع ژن درگیر در بروز بیماری به مطالعه افراد جمعیت می پردازد؟
الف) Linkage Analysis

- Candidate Gene analysis (ب)
 - Single Gene sequencing (ج)
 - Gene wide association study (د)

۱۵۰- ژن‌های TAP و LMP در کدام کلاس HLA قرار گرفته‌اند؟

- الف) هر دو کلاس I
ب) هر دو کلاس II
ج) LMP در کلاس II و TAP در کلاس I
د) LMP در کلاس I و TAP در کلاس II

موفق باشد




جمهوری اسلامی ایران
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معافون آموزشی

مرکز سنجش آموزش پزشکی

کلید نهایی

آزمون بی اچ دی رشته های گروه پزشکی سال تحصیلی ۹۷-۹۶



ایمنی شناسی پزشکی



۱	۴۹	۹۷	۱۳۵	۱۹۳
۲	۵۰	۹۸	۱۴۶	۱۹۴
۳	۵۱	۹۹	۱۴۷	۱۹۵
۴	۵۲	۱۰۰	۱۴۸	۱۹۶
۵	۵۳	۱۰۱	۱۴۹	۱۹۷
۶	۵۴	۱۰۲	۱۵۰	۱۹۸
۷	۵۵	۱۰۳	۱۵۱	۱۹۹
۸	۵۶	۱۰۴	۱۵۲	۲۰۰
۹	۵۷	۱۰۵	۱۵۳	۲۰۱
۱۰	۵۸	۱۰۶	۱۵۴	۲۰۲
۱۱	۵۹	۱۰۷	۱۵۵	۲۰۳
۱۲	۶۰	۱۰۸	۱۵۶	۲۰۴
۱۳	۶۱	۱۰۹	۱۵۷	۲۰۵
۱۴	۶۲	۱۱۰	۱۵۸	۲۰۶
۱۵	۶۳	۱۱۱	۱۵۹	۲۰۷
۱۶	۶۴	۱۱۲	۱۶۰	۲۰۸
۱۷	۶۵	۱۱۳	۱۶۱	۲۰۹
۱۸	۶۶	۱۱۴	۱۶۲	۲۱۰
۱۹	۶۷	۱۱۵	۱۶۳	۲۱۱
۲۰	۶۸	۱۱۶	۱۶۴	۲۱۲
۲۱	۶۹	۱۱۷	۱۶۵	۲۱۳
۲۲	۷۰	۱۱۸	۱۶۶	۲۱۴
۲۳	۷۱	۱۱۹	۱۶۷	۲۱۵
۲۴	۷۲	۱۲۰	۱۶۸	۲۱۶
۲۵	۷۳	۱۲۱	۱۶۹	۲۱۷
۲۶	۷۴	۱۲۲	۱۷۰	۲۱۸
۲۷	۷۵	۱۲۳	۱۷۱	۲۱۹
۲۸	۷۶	۱۲۴	۱۷۲	۲۲۰
۲۹	۷۷	۱۲۵	۱۷۳	۲۲۱
۳۰	۷۸	۱۲۶	۱۷۴	۲۲۲
۳۱	۷۹	۱۲۷	۱۷۵	۲۲۳
۳۲	۸۰	۱۲۸	۱۷۶	۲۲۴
۳۳	۸۱	۱۲۹	۱۷۷	۲۲۵
۳۴	۸۲	۱۳۰	۱۷۸	۲۲۶
۳۵	۸۳	۱۳۱	۱۷۹	۲۲۷
۳۶	۸۴	۱۳۲	۱۸۰	۲۲۸
۳۷	۸۵	۱۳۳	۱۸۱	۲۲۹
۳۸	۸۶	۱۳۴	۱۸۲	۲۳۰
۳۹	۸۷	۱۳۵	۱۸۳	۲۳۱
۴۰	۸۸	۱۳۶	۱۸۴	۲۳۲
۴۱	۸۹	۱۳۷	۱۸۵	۲۳۳
۴۲	۹۰	۱۳۸	۱۸۶	۲۳۴
۴۳	۹۱	۱۳۹	۱۸۷	۲۳۵
۴۴	۹۲	۱۴۰	۱۸۸	۲۳۶
۴۵	۹۳	۱۴۱	۱۸۹	۲۳۷
۴۶	۹۴	۱۴۲	۱۹۰	۲۳۸
۴۷	۹۵	۱۴۳	۱۹۱	۲۳۹
۴۸	۹۶	۱۴۴	۱۹۲	۲۴۰



کلاس (گروهی و خصوصی)



آزمون آزمایشی



مشاوره و پشتیبانی



جزوه



تقویت رزومه



MHLE / MSRT / نمره زبان

۰۲۱ ۶۶۵۷۴۳۴۵
sanapezeski.com



@medical_sana